

## **SVÄLJES HELA**

En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar  
som måste eller bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Absenor Depot	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Absenor	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Absenor	tablett	300 mg	<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Acetylsalicylsyra APL	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Adalat Oros	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Adartrel	filmdragerad tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela
Adrovanse	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Advagraf	depotkapsel, hård		<a href="#">55:34</a>	Måste sväljas hela
Afinitor	tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Agenerase®	kapsel, mjuk		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela
Agiolax	granulat		<a href="#">56:86</a>	Bör sväljas hela
Alenat	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Alenat Veckotablett	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Alendronat	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Alendronat Veckotablett	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Alfadil	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Alfadil BPH	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Alfuzosin	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Alimemazin APL	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Alkeran®	filmdragerad tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Alli	kapsel, hård		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Almogran	filmdragerad tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela
Alvedon	tablett		<a href="#">55:55</a>	Måste sväljas hela
Amaryl	tablett		<a href="#">56:67</a>	Bör sväljas hela
Ameu Elge	kapsel		<a href="#">56:96</a>	Bör sväljas hela
Aminess N	kapsel		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Amoxicillin	kapsel		<a href="#">56:58</a>	Bör sväljas hela
Anafranil Retard EuroPharma	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Anafranil Retard	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Anafranil Retard	dragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Anafranil®	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Ansatisipin	kapsel		<a href="#">56:72</a>	Bör sväljas hela
Aotal	enterotablett		<a href="#">55:08</a>	Måste sväljas hela
Aptivus	kapsel, mjuk		<a href="#">55:10</a>	Måste sväljas hela
Arava	filmdragerad tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Arthrotec	tablett		<a href="#">55:20</a>	Måste sväljas hela
Arthrotec forte	tablett		<a href="#">55:20</a>	Måste sväljas hela
Asacol	enterotablett		<a href="#">55:47</a>	Måste sväljas hela
Asasantin Retard	depotkapsel		<a href="#">56:07</a>	Bör sväljas hela
Atripia	filmdragerad tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela
Avelox	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Avidart	kapsel, mjuk		<a href="#">55:02</a>	Måste sväljas hela
Avodart	kapsel, mjuk		<a href="#">55:02</a>	Måste sväljas hela
Axagon	enterotablett		<a href="#">56:18</a>	Bör sväljas hela
Axiago	enterotablett		<a href="#">56:18</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Azatioprin	tablett		<a href="#">56:32</a>	Bör sväljas hela
Belladonna-ergotamin	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Bezalip Retard	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Bezalip®	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Bicalutamide Bluefish	filmdragerad tablett		<a href="#">56:92</a>	Bör sväljas hela
Biltricide	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Bisoprolol Stada	filmdragerad tablett		<a href="#">56:12</a>	Bör sväljas hela
Bondronat	filmdragerad tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Bonefos®	tablett	800 mg	<a href="#">56:27</a>	Bör sväljas hela
Bonviva	filmdragerad tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Bricanyl Depot	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Brufen Retard	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Budenofalk	enterokapsel, hård		<a href="#">56:70</a>	Bör sväljas hela
Campral	enterotablett		<a href="#">55:08</a>	Måste sväljas hela
Cardizem Unotard	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Cardizem®	tablett		<a href="#">56:08</a>	Bör sväljas hela
Cardizem® Retard®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Carlson Vitamin A	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Carotaben®	kapsel		<a href="#">56:47</a>	Bör sväljas hela
Cedax	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Cefadroxil	kapsel		<a href="#">56:74</a>	Bör sväljas hela
Cefamox®	kapsel		<a href="#">56:74</a>	Bör sväljas hela
Cefamox	kapsel, hård	500 mg	<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Cefamox	tablett	1 g	<a href="#">56:67</a>	Bör sväljas hela
Celebra	kapsel		<a href="#">56:68</a>	Bör sväljas hela
CellCept	kapsel		<a href="#">55:56</a>	Måste sväljas hela
CellCept	tablett		<a href="#">55:21</a>	Måste sväljas hela
Centyl K Mite	tablett		<a href="#">55:39</a>	Måste sväljas hela
Certican	tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Cetirizin Mylan	filmdragerad tablett		<a href="#">56:12</a>	Bör sväljas hela
Champix	filmdragerad tablett		<a href="#">56:61</a>	Bör sväljas hela
Ciklosporin IVAX	kapsel, mjuk		<a href="#">55:3</a>	Måste sväljas hela
Circadin	depottablett		<a href="#">55:2</a>	Måste sväljas hela
Colazid	kapsel		<a href="#">56:34</a>	Bör sväljas hela
Colpermin	tablett		<a href="#">55:19</a>	Måste sväljas hela
Combizym®	tablett		<a href="#">55:03</a>	Måste sväljas hela
Concerta	depottablett		<a href="#">55:24</a>	Måste sväljas hela
Copegus	filmdragerad tablett		<a href="#">55:23</a>	Måste sväljas hela
Coramil	depotkapsel		<a href="#">55:34</a>	Måste sväljas hela
Creon	enterokapsel, hård		<a href="#">56:62</a>	Bör sväljas hela
Creon 10000	enterokapsel, hård		<a href="#">56:62</a>	Bör sväljas hela
Creon 25000	enterokapsel, hård		<a href="#">56:63</a>	Bör sväljas hela
Creon forte	enterokapsel, hård		<a href="#">56:63</a>	Bör sväljas hela
Crixivan	kapsel		<a href="#">56:54</a>	Bör sväljas hela
Curbisal	kapsel		<a href="#">56:3</a>	Bör sväljas hela
Cycloserine	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Cymbalta	enterokapsel, hård		<a href="#">55:09</a>	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Dalacin	kapsel		<a href="#">55:07</a>	Måste sväljas hela
Danatrol	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Dapson	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Depolan	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Detrusitol SR	depotkapsel, hård		<a href="#">56:46</a>	Bör sväljas hela
Diacomit	kapsel, hård		<a href="#">55:41</a>	Måste sväljas hela
Diklofenac, Diklofenak	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Diclofenac T, Diklofenak T	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Diflucan	kapsel		<a href="#">56:65</a>	Bör sväljas hela
Dimetikon	kapsel, mjuk		<a href="#">56:13</a>	Bör sväljas hela
Dimor	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Dipentum	kapsel		<a href="#">56:69</a>	Bör sväljas hela
Disofrol®	depottablett		<a href="#">55:24</a>	Måste sväljas hela
Distraneurine	kapsel, mjuk		<a href="#">55:10</a>	Måste sväljas hela
Ditropan	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Dolcontin Unotard	depotkapsel		<a href="#">56:46</a>	Bör sväljas hela
Dolcontin®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Doloxene®	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Doxazosin	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Doxyferm	tablett		<a href="#">56:30</a>	Bör sväljas hela
Dulcolax®	enterotablett		<a href="#">55:47</a>	Måste sväljas hela
Durbis Retard	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Durbis®	kapsel		<a href="#">56:22</a>	Bör sväljas hela
Duroferon®	depottabletter (Duretter®)		<a href="#">55:43</a>	Måste sväljas hela
Eeze	filmdragerad tablett		<a href="#">56:94</a>	Bör sväljas hela
Eezeneo	filmdragerad tablett		<a href="#">56:94</a>	Bör sväljas hela
Efedrinhydroklorid	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Efexor Depot	depotkapsel		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Efient	filmdragerad tablett		<a href="#">56:76</a>	Bör sväljas hela
Egazil Duretter®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Emconcor	filmdragerad tablett		<a href="#">56:12</a>	Bör sväljas hela
Emconcor CHF	filmdragerad tablett		<a href="#">56:12</a>	Bör sväljas hela
Emconcor CHF	filmdragerad tablett	1,25 mg	<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Emend	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Emselex	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Emtriva	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Enalaprilmaleat	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Entocort®	depotkapsel, hård		<a href="#">56:71</a>	Bör sväljas hela
Eox	filmdragerad tablett		<a href="#">56:26</a>	Bör sväljas hela
Epanutin®	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Equasym Depot	kapsel med modifierad frisättning		<a href="#">56:59</a>	Bör sväljas hela
Ergenyl	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Ergenyl Retard	depotgranulat, dospåse		<a href="#">55:11</a>	Måste sväljas hela
Ergenyl Retard	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Ery-Max®	enterokapsel, hård		<a href="#">56:19</a>	Bör sväljas hela
Eskimo-3	kapsel		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Esopral	enterotablett		<a href="#">56:18</a>	Bör sväljas hela
Estracyt®	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Etalpa	kapsel		<a href="#">56:13</a>	Bör sväljas hela
Etinylestradiol	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Euphylong	depotkapsel		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
E-vimin®	kapsel, mjuk		<a href="#">56:53</a>	Bör sväljas hela
Exelon	kapsel		<a href="#">56:82</a>	Bör sväljas hela
Famotidin Hexal	filmdragerad tablett		<a href="#">56:49</a>	Bör sväljas hela
Famvir	filmdragerad tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela
Felodipin	depottablett		<a href="#">55:27</a>	Måste sväljas hela
Femar	tablett		<a href="#">55:1</a>	Måste sväljas hela
Fevarin	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Finasterid	filmdragerad tablett		<a href="#">55:68</a>	Måste sväljas hela
Fluconazol, Flukonazol	kapsel, hård		<a href="#">56:65</a>	Bör sväljas hela
Fludara	filmdragerad tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Flukloxacillin Evolan	kapsel, hård		<a href="#">56:58</a>	Bör sväljas hela
Fluoxetin Sandoz, Teva, ratiopharm	kapsel, hård		<a href="#">56:58</a>	Bör sväljas hela
Folsyra	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Fosamax	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Fosamax Veckotablett	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Fosavance	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Fosfat	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Fulcro	kapsel, hård		<a href="#">56:79</a>	Bör sväljas hela
Fumaderm	tablett		<a href="#">55:29</a>	Måste sväljas hela
Furix Retard	depotkapsel		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Gabapentin Actavis, Hexal, Nycomed, Teva	kapsel, hård		<a href="#">56:72</a>	Bör sväljas hela
Gabapentin Teva, Ranbaxy	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Gemadol	depotkapsel, hård		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Glimepirid	tablett		<a href="#">56:67</a>	Bör sväljas hela
Glivec	filmdragerad tablett		<a href="#">56:52</a>	Bör sväljas hela
Glucophage	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Glukosamin Pharma Nord	kapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Heminevrin®	kapsel		<a href="#">55:10</a>	Måste sväljas hela
Hermolepsin® Retard	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Humatin	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Hycamtin	kapsel, hård		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Hydrea	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Hydrokortison APL	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Hydroxyurea Medac	kapsel, hård		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Hypochoylin®	tablett		<a href="#">56:48</a>	Bör sväljas hela
Imdur	depottablett	120 mg	<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Imdur®	depottablett	30 mg, 60 mg	<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Imigran Novum	filmdragerad tablett		<a href="#">56:83</a>	Bör sväljas hela
Imodium	kapsel		<a href="#">56:85</a>	Bör sväljas hela
Imodium	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Imurel®	tablett		<a href="#">56:32</a>	Bör sväljas hela
Inderal® Retard	depotkapsel, hård		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Inexium	enterotablett		<a href="#">56:18</a>	Bör sväljas hela
Inspra	filmdragerad tablett		<a href="#">56:26</a>	Bör sväljas hela
Intelligence	tablett		<a href="#">56:78</a>	Bör sväljas hela
Invega	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Invirase	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Iressa	tablett		<a href="#">56:91</a>	Bör sväljas hela
Isentress	filmdragerad tablett		<a href="#">56:00</a>	Bör sväljas hela
Ismo Retard	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Isodur®	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Isoptin® Retard	depottablett	120 mg	<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Isoptin Retard	depottablett	180mg 240mg	<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Isosorbidmononitrat	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Itraconazol, Itrakonazol, Merck, Stada	kapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Itrakonazol Actavis	kapsel, hård		<a href="#">56:9</a>	Bör sväljas hela
Itrakonazol Sandoz	kapsel, hård		<a href="#">56:95</a>	Bör sväljas hela
Kaleorid	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Kaletra	kapsel mjuk		<a href="#">56:96</a>	Bör sväljas hela
Kaletra	filmdragerad tablett		<a href="#">55:05</a>	Måste sväljas hela
Kaptopril	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Karbakolinklorid	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Ketek	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Ketoprofen	depotkapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Kiniduron Depot	tablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Klomipramin Mylan	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Kortisonacetat	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Kreon 10000	enterokapsel, hård		<a href="#">56:62</a>	Bör sväljas hela
Kreon 25000	enterokapsel, hård		<a href="#">56:63</a>	Bör sväljas hela
Kreon forte	enterokapsel, hård		<a href="#">56:63</a>	Bör sväljas hela
Kreon für kinder	mikropellets		<a href="#">55:40</a>	Måste sväljas hela
Lafunomyl	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Lamictal	tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Lamotrigin	tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Lampren SGC U12	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Lamprene	kapsel		<a href="#">56:96</a>	Bör sväljas hela
Lansoprazol	enterokapsel, hård		<a href="#">56:19</a>	Bör sväljas hela
Lanvis®	tablett		<a href="#">56:50</a>	Bör sväljas hela
Lariam	tablett		<a href="#">56:97</a>	Bör sväljas hela
Lasix® Retard	depotkapsel		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Laxoberal®	kapsel, mjuk		<a href="#">56:13</a>	Bör sväljas hela
Lescol	kapsel, hård		<a href="#">56:58</a>	Bör sväljas hela
Lescol Depot	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Leukeran®	filmdragerad tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Levodopa/Carbidopa ratiopharm	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Lipanthyl	kapsel, hård		<a href="#">56:79</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Litarex	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Lithionit®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Lixacol	enterotablett		<a href="#">55:47</a>	Måste sväljas hela
Logimat forte	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Logimax	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Logimax® Forte	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Lomir SRO	depotkapsel		<a href="#">55:34</a>	Måste sväljas hela
Lomustine Medac	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Loperamid Mylan	kapsel, hård		<a href="#">56:85</a>	Bör sväljas hela
Lorabid	kapsel, hård		<a href="#">56:75</a>	Bör sväljas hela
Losec	enterokapsel, hård		<a href="#">56:19</a>	Bör sväljas hela
Losec	enterotablett		<a href="#">56:55</a>	Bör sväljas hela
Lyrica	kapsel, hård		<a href="#">56:88</a>	Bör sväljas hela
Lysodren	tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Madopark Depot	depotkapsel		<a href="#">55:34</a>	Måste sväljas hela
Mallorol® Retard®	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Marinol	kapsel		<a href="#">55:10</a>	Måste sväljas hela
Maxalt	tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela
Medikinet	depotkapsel, hård		<a href="#">56:59</a>	Bör sväljas hela
Metformin	filmdragerad tablett		<a href="#">56:92</a>	Bör sväljas hela
Methotrexate Orion	tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Methotrexate Teva, Wyeth	tablett		<a href="#">56:50</a>	Bör sväljas hela
Metionin	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Metoprolol GEA Retard 50 mg	depottablett	50 mg	<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Metoprolol GEA Retard	depottablett	100, 200 mg	<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Metoprolol Actavis, GEA Retard, ratiopharm	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Metoprolol Sandoz	depottablett		<a href="#">56:25</a>	Bör sväljas hela
Metoratio	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Metotab	tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Metylskopolamin-nitrat	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Mianserin Mylan 10 mg, 30 mg	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Mianserin Mylan	filmdragerad tablett	60 mg	<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Mimpara	filmdragerad tablett		<a href="#">55:37</a>	Måste sväljas hela
Minifom	kapsel		<a href="#">56:90</a>	Bör sväljas hela
Mirtazapin Alternova, Arrow, Hexal, Stada	filmdragerad tablett		<a href="#">56:92</a>	Bör sväljas hela
Mirtazapin Actavis, Imi- Pharma, Krka, ratiopharm, Teva	(filmdragerad) tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Monoket OD	depotkapsel		<a href="#">55:34</a>	Måste sväljas hela
Mozoc®	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Mutaflor	kapsel		<a href="#">55:50</a>	Måste sväljas hela
Myfortic	enterotablett		<a href="#">55:13</a>	Måste sväljas hela
Myleran®	filmdragerad tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Naprosyn Entero	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Naramig	tablett		<a href="#">56:77</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Natrilix Retard	deptablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Natriumklorid	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Natulan	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Navelbine	kapsel, mjuk		<a href="#">55:32</a>	Måste sväljas hela
Navoban	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Neotigason	kapsel		<a href="#">56:23</a>	Bör sväljas hela
Neurontin	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Neurontin	filmdragerad tablett	med skåra	<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Neurontin Cross Pharma, Euro Pharma, Medartum, Omnia, Orifarm	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Neurotin Pfizer	filmdragerad tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Neurotin Cross Pharma, Medartum, Omnia, Orifarm, Pfizer, Teva	kapsel, hård		<a href="#">56:72</a>	Bör sväljas hela
Nexavar	filmdragerad tablett		<a href="#">56:76</a>	Bör sväljas hela
Nexium HP®	tablett		<a href="#">56:17</a>	Bör sväljas hela
Nexium®	enterotablett		<a href="#">56:18</a>	Bör sväljas hela
Niaspan	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Niferex	enterokapsel		<a href="#">56:84</a>	Bör sväljas hela
Nipaxon®	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Nixacid	enterokapsel hård		<a href="#">56:19</a>	Bör sväljas hela
Nobligan	kapsel, hård		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Nobligan	tablett		<a href="#">56:51</a>	Bör sväljas hela
Nobligan Retard	kapsel, hård		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Norflex®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Norfloxacina	tablett		<a href="#">56:04</a>	Bör sväljas hela
Norvir	kapsel		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela
Noskapin ACO	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Omacor	kapsel		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela
Omeprazol Arrow, Mylan, Orifarm, ratiopharm, Sandoz, Stada, Teva	enterokapsel, hård		<a href="#">56:19</a>	Bör sväljas hela
Omeprazol Actavis, A Generic Pharm, Bluefish	enterokapsel, hård		<a href="#">56:11</a>	Bör sväljas hela
Omeprazol BMN Pharma	enterotablett		<a href="#">55:03</a>	Måste sväljas hela
Omeprazol Abcur	enterotablett		<a href="#">55:08</a>	Måste sväljas hela
Omnice	kapsel		<a href="#">56:99</a>	Bör sväljas hela
Optinate	filmdragerad tablett		<a href="#">55:51</a>	Måste sväljas hela
Optinate Combi	filmdragerad tablett		<a href="#">55:59</a>	Måste sväljas hela
Optinate Septimum	filmdragerad tablett		<a href="#">55:51</a>	Måste sväljas hela
Oracea	kapsel med modifierad frisättning		<a href="#">55:41</a>	Måste sväljas hela
Orfiril	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Orfiril Long	depotgranulat		<a href="#">56:45</a>	Bör sväljas hela
Orfiril Long	depotkapsel, hård		<a href="#">56:66</a>	Bör sväljas hela
Oriptan	filmdragerad tablett		<a href="#">56:2</a>	Bör sväljas hela
Orudis Retard	depotkapsel, hård		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Orudis®	kapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Oxcarbazepin Merck NM	filmdragerad tablett		<a href="#">56:14</a>	Bör sväljas hela
Oxybutynin Mylan	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
OxyContin	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Oxycodone ratiopharm	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
OxyNorm	kapsel, hård		<a href="#">56:57</a>	Bör sväljas hela
Oxytetral	tablett		<a href="#">56:27</a>	Bör sväljas hela
Palladon	depotkapsel, hård		<a href="#">56:46</a>	Bör sväljas hela
Palladon	kapsel, hård		<a href="#">56:15</a>	Bör sväljas hela
Pantoloc	enterotablett		<a href="#">55:44</a>	Måste sväljas hela
Pantoprazol, Pantoprazole	enterotablett		<a href="#">55:44</a>	Måste sväljas hela
Pariet	enterotablett		<a href="#">55:44</a>	Måste sväljas hela
Parlodel	kapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Paroxetin Teva	filmdragerad tablett		<a href="#">56:67</a>	Bör sväljas hela
Pentasa	depottablett		<a href="#">56:7</a>	Bör sväljas hela
Pentasa Sachet	depotgranulat		<a href="#">55:38</a>	Måste sväljas hela
Persantin Depot	depotkapsel		<a href="#">56:99</a>	Bör sväljas hela
Phos-Ex	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Pikasol forte	kapsel, mjuk		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela
Plendil®	depottablett		<a href="#">55:27</a>	Måste sväljas hela
Pradaxa	kapsel, hård		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Precosa	kapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Prednisolon	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Priligy	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Prograf	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Prometax	kapsel hård		<a href="#">56:82</a>	Bör sväljas hela
Propecia	tablett		<a href="#">56:21</a>	Bör sväljas hela
Proscar	tablett		<a href="#">55:49</a>	Måste sväljas hela
Puri-nethol®	tablett		<a href="#">56:50</a>	Bör sväljas hela
Ramipril Actavis, Copyfarm, Ratiopharm, Sandoz	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Ramipril Actavis 5 mg, Stada, sanofi-avantis,	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Ramipril Hexal	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Ramipril Winthrop	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Ramipril/Hydroklortiazid	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Rebetol	kapsel		<a href="#">55:49</a>	Måste sväljas hela
Reductil	kapsel, hård		<a href="#">55:33</a>	Måste sväljas hela
Relpax	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Remeron	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Reminyl	depotkapsel		<a href="#">56:36</a>	Bör sväljas hela
Renagel	filmdragerad tablett		<a href="#">55:28</a>	Måste sväljas hela
Requip Depot	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Retrovir	kapsel		<a href="#">56:80</a>	Bör sväljas hela
Reumacon	kapsel		<a href="#">55:35</a>	Måste sväljas hela
Revlimid	kapsel, hård		<a href="#">55:33</a>	Måste sväljas hela
Reyataz	kapsel, hård		<a href="#">56:80</a>	Bör sväljas hela
Rimactan®	kapsel, hård		<a href="#">56:34</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Rinexin®	depottablett		<a href="#">55:24</a>	Måste sväljas hela
Risperidon Arrow	filmdragerad tablett		<a href="#">56:92</a>	Bör sväljas hela
Risperidon Teva	filmdragerad tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Ritalin	kapsel med modifierad frisättning		<a href="#">56:43</a>	Bör sväljas hela
Roaccutan	kapsel		<a href="#">56:5</a>	Bör sväljas hela
Rocaltrol	kapsel		<a href="#">55:22</a>	Måste sväljas hela
Ropinirol Mylan	filmdragerad tablett		<a href="#">56:67</a>	Bör sväljas hela
Rytmonorm	depottablett		<a href="#">56:39</a>	Bör sväljas hela
Sabamin	kapsel		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela
Salagen	tablett		<a href="#">56:81</a>	Bör sväljas hela
Salazopyrin EN	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Salofalk	enterodepotgranulat		<a href="#">55:06</a>	Måste sväljas hela
Sandimmun Neoral	kapsel		<a href="#">55:3</a>	Måste sväljas hela
Saroten	filmdragerad tablett		<a href="#">56:76</a>	Bör sväljas hela
Sebivo	filmdragerad tablett		<a href="#">56:2</a>	Bör sväljas hela
Selen	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Seloken ZOC	depottablett		<a href="#">56:25</a>	Bör sväljas hela
Sendoxan	dragerad tablett		<a href="#">56:1</a>	Bör sväljas hela
Seroquel Depot	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Sertralin Bluefish	filmdragerad tablett	50 mg	<a href="#">56:14</a>	Bör sväljas hela
Sertralin Bluefish	filmdragerad tablett	100 mg	<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Siduro Retard	depotkapsel, hård		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Sinemet Depot	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Sinemet Depot Mite	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Sorbangil	tablett		<a href="#">56:24</a>	Bör sväljas hela
SP-54 PPS	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Spironolakton	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Sporanox	kapsel, hård		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Sprycel	filmdragerad tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Stalevo	filmdragerad tablett		<a href="#">56:26</a>	Bör sväljas hela
Starlix	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Stocrin	kapsel		<a href="#">56:79</a>	Bör sväljas hela
Strattera	kapsel, hård		<a href="#">56:16</a>	Bör sväljas hela
Sulfasalazin medac	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Sumatriptan Bluefish	tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Sumatriptan Copyfarm, Ratiopharm 100 mg	tablett		<a href="#">56:2</a>	Bör sväljas hela
Sumatriptan Stada	filmdragerad tablett		<a href="#">56:26</a>	Bör sväljas hela
Sumatriptan BMM, Teva	filmdragerad tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela
Sumatriptan Actavis, Mylan, Sandoz	(film)dragerad tablett		<a href="#">56:97</a>	Bör sväljas hela
Sumatriptan ratiofarm 50 mg	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Surmontil	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Sutent	kapsel, hård		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Tambocor Retard	depotkapsel, hård		<a href="#">55:04</a>	Måste sväljas hela
Tamiflu	kapsel, hård		<a href="#">56:60</a>	Bör sväljas hela
Targretin	kapsel, mjuk		<a href="#">55:32</a>	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Targiniq	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tarivid	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Tasmar	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Tavanic	filmdragerad tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Tegretol Retard	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Temodal	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Terbinafin AGP	tablett		<a href="#">56:67</a>	Bör sväljas hela
Tetracyklin Meda	tablett		<a href="#">55:42</a>	Måste sväljas hela
Tetralysal	kapsel		<a href="#">55:18</a>	Måste sväljas hela
Thalidomide Celegene	kapsel, hård		<a href="#">55:15</a>	Måste sväljas hela
Thelin	filmdragerad tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Theo-Dur®	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Tiparol OD®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tiparol®	kapsel, hård		<a href="#">56:73</a>	Bör sväljas hela
Tiparol® Retard	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Toilax®	enterotablett		<a href="#">55:45</a>	Måste sväljas hela
Tolvon®	tablett	utan skåra	<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Tolvon	tablett	med skåra	<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Topamac	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Topamax	filmdragerad tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Topimax	kapsel, hård		<a href="#">56:02</a>	Bör sväljas hela
Topimax	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Topiramate Sandoz	filmdragerad tablett		<a href="#">55:31</a>	Måste sväljas hela
Toviaz	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tradolan Retard	depottablett	100 mg	<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tradolan Retard	depottablett	150, 200 mg	<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
Tramadol Actavis	kapsel, hård		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Tramadol Stada	kapsel, hård	50 mg	<a href="#">56:03</a>	Bör sväljas hela
Tramadol Hexal	kapsel	50 mg 100 mg	<a href="#">56:73</a>	Bör sväljas hela
Tramadol Alternova	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tramadol Retard Hexal	depottablett		<a href="#">55:48</a>	Måste sväljas hela
Tramadol Retard Actavis, Medartuum	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tramuno	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Tranxene	depottablett		<a href="#">55:16</a>	Måste sväljas hela
Trental	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Trevis	kapsel		<a href="#">56:56</a>	Bör sväljas hela
Triatec	tablett		<a href="#">56:42</a>	Bör sväljas hela
Triatec comp	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Triatec comp mite	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Triatec Start	tablett		<a href="#">56:20</a>	Bör sväljas hela
Trileptal	filmdragerad tablett		<a href="#">56:14</a>	Bör sväljas hela
Trimonil Retard	depottablett		<a href="#">56:10</a>	Bör sväljas hela
UFT	kapsel, hård		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Undestor Testocaps	kapsel		<a href="#">56:6</a>	Bör sväljas hela
Unilife A	kapsel		<a href="#">56:01</a>	Bör sväljas hela
Urocit-K	kapsel		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Ursofalk	kapsel		<a href="#">56:58</a>	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Valcyte	filmdragerad tablett		<a href="#">55:23</a>	Måste sväljas hela
Vancocin®	kapsel		<a href="#">55:36</a>	Måste sväljas hela
Vancomycin Axellia	kapsel		<a href="#">55:36</a>	Måste sväljas hela
Vanquin	tablett		<a href="#">56:35</a>	Bör sväljas hela
Warfarinnatrium	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Wellbutrin	tablett med modifierad frisättning		<a href="#">55:60</a>	Måste sväljas hela
Venastat	depotkapsel		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Venlafaxine AGP	depotkapsel		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Venlafaxin Actavis, Arrow, Bluefish, Mylan, ratiopharm, Sandoz, Stada	depotkapsel		<a href="#">55:04</a>	Måste sväljas hela
Venlafaxin Krka, Orifarm	depotkapsel		<a href="#">55:34</a>	Måste sväljas hela
Venlafaxin EQL Pharma	depotkapsel, hård		<a href="#">56:29</a>	Bör sväljas hela
Vepesid	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Vesicare	filmdragerad tablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Vibranord	tablett		<a href="#">56:31</a>	Bör sväljas hela
Videx EC	enterokapsel, hård		<a href="#">55:17</a>	Måste sväljas hela
Wilzin	kapsel, hård		<a href="#">56:88</a>	Bör sväljas hela
Viramune	tablett		<a href="#">56:93</a>	Bör sväljas hela
Vivotif	enterokapsel, hård		<a href="#">55:50</a>	Måste sväljas hela
Voltaren T	tablett		<a href="#">56:2</a>	Bör sväljas hela
Voltaren®	enterotablett		<a href="#">55:26</a>	Måste sväljas hela
Voxra	tablett med modifierad frisättning		<a href="#">55:60</a>	Måste sväljas hela
Xagrid	kapsel, hård		<a href="#">55:41</a>	Måste sväljas hela
Xanor Depot	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Xatral OD	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Xeloda	tablett		<a href="#">55:61</a>	Måste sväljas hela
Xenical	kapsel, hård		<a href="#">56:4</a>	Bör sväljas hela
Yentreve	enterokapsel, hård		<a href="#">55:09</a>	Måste sväljas hela
Zavedos	kapsel		<a href="#">55:12</a>	Måste sväljas hela
Zeldox	kapsel, hård		<a href="#">56:40</a>	Bör sväljas hela
Zemplar	kapsel, mjuk		<a href="#">55:41</a>	Måste sväljas hela
Zerit	kapsel		<a href="#">56:28</a>	Bör sväljas hela
Zink 220	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Zink APL	kapsel		<a href="#">56:05</a>	Bör sväljas hela
Zomig	filmdragerad tablett		<a href="#">56:76</a>	Bör sväljas hela
Zonegran	kapsel, hård		<a href="#">56:47</a>	Bör sväljas hela
Zumo	dragerad tablett		<a href="#">56:97</a>	Bör sväljas hela
Zyban®	depottablett		<a href="#">55:01</a>	Måste sväljas hela
Zyprexa	dragerad tablett		<a href="#">56:8</a>	Bör sväljas hela

## Kommentarer till användaranvisning 55

- 55:01 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:02 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eller tuggas eftersom innehållet kan orsaka irritation i mun och svalg. Dessutom är det inte säkert att man får i sig hela dosen om kapseln delas. Gravida kvinnor ska inte hantera läckande kapslar. Om läkemedlet tas upp genom huden kan det hämma utvecklingen av ett manligt fosters yttre könsorgan. Vid hudkontakt med läckande kapslar tvätta omedelbart med tvål och vatten.
- 55:03 Tabletterna har en hinna som skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om tabletterna delas, tuggas eller krossas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet.
- 55:04 Depotkapslarna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kapslarna öppnas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:05 Upptaget av läkemedlet i kroppen, och därmed effekten blir bättre om tabletten sväljs hel. Tabletterna ska därför inte delas, krossas eller tuggas. Dessutom smakar tabletterna illa.
- 55:06 Läkemedlet ska verka i tarmen. Granulatet består av korn som har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Kornen frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan och läkemedlet verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:07 Innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnor. Kapslarna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med innehållet.
- 55:08 Enterotabletterna har en hinna som skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Tabletterna löses därför upp först i tarmen. Tabletterna ska sväljas hela för att ge så bra effekt som möjligt och för att minska risken för biverkningar från magen. Tabletterna får inte krossas eller tuggas.
- 55:09 Enterokapslarna innehåller korn som har en hinna som skyddar läkemedlet mot att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet. Det är inte undersökt om kornen kan tömmas ut ur kapseln och sväljas.
- 55:1 Tabletterna har en skyddande hinna för att förhindra att det verksamma ämnet, som är mycket aktivt, sprids till omgivningen. Om tabletterna delas finns dessutom risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 55:10 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen.
- 55:11 Depotgranulatet består av korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:12 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Om kapslarna delas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon.
- 55:13 Det verksamma ämnet är vävnadsretande och tabletterna har därför en hinna som gör att de löses upp först i tarmen. Om tabletterna krossas finns risk för att innehållet inandas eller kommer i kontakt med huden. Man bör inte hantera trasiga tabletter utan handskar.
- 55:14 Enterogranulatet består av korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras i den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet. Granulatet kan blandas med vätska eller mat, varefter intaget ska ske omedelbart. Det är då viktigt att kornen inte tuggas eller krossas.
- 55:15 Kapslarna ska inte öppnas, krossas eller tuggas. Läkemedlet kan vara fosterskadande och bör inte spridas i omgivningen.
- 55:16 Innehållet i kapslarna är mycket fukt känsligt och sväller om det utsätts för fukt. Kapslarna ska därför inte öppnas.
- 55:17 Enterokapselns hölje löses upp först i tarmen och skyddar därmed läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kapslarna öppnas eller tuggas försämrades effekten av läkemedlet.
- 55:18 Innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnor. Kapslarna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med innehållet. Det är heller inte känt hur läkemedlets effekt påverkas om kapslarna öppnas.
- 55:19 Kapslarna ska inte tuggas eller delas. Läkemedlet ska verka i tarmen och kapselhöljet är därför utformat så kapseln passerar magsäcken utan att lösas upp. Dessutom kan pepparmintolja orsaka irritation i munnen och matstrupen om kapslarna tuggas eller delas.
- 55:2 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas verkar de under kortare tid än förväntat.

- 55:20 Tabletterna består av två lager. Innerst finns en kärna med ett antiinflammatoriskt ämne omgivet av en hinna som skyddar tabletterna från att lösas upp i magsäcken. Därmed frisätts läkemedlet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Ytterst på tabletterna finns ett ämne som frisätts i magsäcken och som skyddar magens slemhinna. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas ökar risken för magbesvär.
- 55:21 Innehållet i tabletterna är vävnadsretande. Om tabletterna krossas finns risk för att ämnet inandas eller kommer i direkt kontakt med hud eller slemhinnor. Man bör inte hantera trasiga tabletter utan handskar.
- 55:22 Kapslarna ska inte öppnas, dels för att man ska undvika att få innehållet på huden och dels för att innehållet är ljus- och syrekänsligt.
- 55:23 Tabletterna har en hinna som förhindrar att läkemedlet andas in eller kommer i kontakt med huden. Läkemedlet är fosterskadande och bör inte spridas i omgivningen. Tabletterna ska därför inte delas. Trasiga tabletter ska inte vidröras.
- 55:24 Depottabletterna ger både snabb och långvarig effekt. De består av två lager, ett som snabbt löses upp och frisätter läkemedlet och ett som frisätter läkemedlet successivt under längre tid. Tabletterna ger på så sätt både en snabb och en jämn effekt dygnet runt samt minskad risk för biverkningar. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:25 Depottabletterna ger både snabb och långvarig effekt. De består av två lager, ett som snabbt löses upp i magen och frisätter läkemedlet och ett som löses upp först i tarmen. Effekten av läkemedlet från det inre lagret kommer därför först efter 4-6 timmar. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:26 Innehållet i tabletterna verkar irriterande på magens slemhinnor. Tabletterna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Därmed frisätts innehållet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Om tabletten krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.
- 55:27 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då ett jämnt upptag av läkemedel i kroppen och minskad risk för biverkningar. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas blir upptaget snabbt och koncentrationen av läkemedel i kroppen hög någon timme efter intag, vilket ökar risken för biverkningar.
- 55:28 Tabletterna ska inte tuggas.
- 55:29 Enterotabletterna har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Tabletterna ska sväljas hela för att inte hinnan ska förstöras. Tabletterna får inte krossas eller tuggas.
- 55:3 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen.
- 55:30 Enterogranulatet består av korn som har en hinna för att dölja saltsmaken, eftersom barnet kan kväljas av kraftig saltsmak. Saltsmaken kommer fram om granulatet hålls i munnen mer än ca 20 sekunder. Granulatet ska omedelbart efter intag sköljas ned med vatten eller annan dryck, och ska inte tuggas eller krossas.
- 55:31 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte krossas eller tuggas.
- 55:32 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Innehållet i kapslarna är flytande och om kapslarna delas kan det finnas risk för spill av innehållet, som inte ska komma i kontakt med hud och ögon.
- 55:33 Kapslarna ska sväljas hela för att effekten ska bli så bra som möjligt. Kapslarna ska inte delas eller tuggas.
- 55:34 Depotkapslarna innehåller små korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:35 Kapslarna är omgivna av ett skyddande hölje för att de inte ska lösas upp förrän de nått tarmen.
- 55:36 Innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnor. Kapslarna ska sväljas hela för att minska risken för biverkningar från magen.
- 55:37 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas.
- 55:38 Depotgranulatet består av korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel genom hela magtarmkanalen. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Innehållet i dospåsen töms på tungan och sköljs ner med vatten eller apelsinjuice.
- 55:39 Tabletterna är utformade så att det blodtryckssänkande ämnet snabbt frisätts i magsäcken medan kalium frisätts successivt under lång tid. Därmed minskar risken för biverkningar från magen orsakade av kalium. Om tabletterna krossas eller tuggas ökar risken för biverkningar.
- 55:40 Kornen har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet.

- 55:41 Det är inte undersökt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna ska sväljas hela.
- 55:42 Innehållet i tableterna verkar irriterande på slemhinnor. Tableterna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med innehållet. Tableterna ska inte delas, krossas eller tuggas.
- 55:43 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Kroppen kan då lättare tillgodogöra sig järnet och risken för biverkningar från mage och tarm minskar. Om tableterna delas, krossas eller tuggas ökar risken för biverkningar och effekten försämras.
- 55:44 Enterotabletterna har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Tableterna ska lösas upp i tarmen för att ge så bra effekt som möjligt. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan.
- 55:45 Enterotabletterna har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Därmed frisätts läkemedlet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan.
- 55:47 Läkemedlet ska verka i tarmen. Tableterna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämrade effekt.
- 55:48 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om tableterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Obs! Trots att depottabletterna har en skåra får de alltså inte delas.
- 55:49 Kapslarna ska inte öppnas för att förhindra att innehållet inandas eller kommer i kontakt med huden. Läkemedlet kan vara fosterskadande och bör inte spridas i omgivningen. Trasiga kapslar ska inte vidröras. Om pulver från kapslarna kommer i kontakt med huden tvättas noga med tvål och vatten. Om pulver från kapslarna kommer i kontakt med ögat sköljs noga med vatten.
- 55:50 Läkemedlet ska verka i tarmen. Kapselhöljet är därför utformat så att det inte löses upp i magsäcken. Om kapslarna öppnas, krossas eller tuggas försämras effekten av läkemedlet.
- 55:51 Tableterna har en hinna som skyddar matstrupen från kontakt med läkemedlet, som verkar irriterande på slemhinnor. Man ska inte tugga eller suga på tableterna eftersom det då finns risk för irritation i munhåla och svalg.
- 55:55 Tableterna ger både snabb och långvarig effekt. De består av två lager, ett som snabbt löses upp och frisätter läkemedel och ett som frisätter läkemedel successivt under längre tid. Tableterna ger på så sätt både en snabb och jämn effekt dygnet runt samt minskad risk för biverkningar. Om tableterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:56 Innehållet i kapslarna är vävnadsretande. Om kapslarna öppnas eller krossas finns risk för att ämnet inandas eller kommer i kontakt med hud eller slemhinnor. Man bör inte hantera trasiga kapslar utan handskar.
- 55:59 Risedronattabletterna har en hinna för att skydda matstrupen från kontakt med läkemedlet, som verkar irriterande på slemhinnor. Man ska inte tugga eller suga på tableterna eftersom det då finns risk för irritation i munhåla och svalg.
- 55:60 Tableterna är utformade så att läkemedlet frisätts successivt under lång tid. Tableterna ska därför inte krossas eller tuggas.
- 55:61 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Om tableterna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon.
- 55:68 Tableterna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas eller krossas.

## Kommentarer till användaranvisning 56 och 57

- 56:00      Tabletterna bör inte tuggas, krossas eller delas. Anledningen är dels att undvika den bittra smaken och dels för att effekten ska bli så bra som möjligt.
- 56:01      Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:02      Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös över t ex filmjolk, yoghurt eller äppelmos. Denna blandning av föda och granulat skall sväljas genast utan att tuggas. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:03      Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med något livsmedel som döljer smaken. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:04      Tabletterna bör inte delas, tuggas eller krossas eftersom det kan påverka läkemedlets upptag i kroppen.
- 56:05      Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med riklig mängd vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:06      Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran eller röras ut i vatten, men får inte krossas eller tuggas eftersom de då verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 56:07      Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Kapslarna innehåller även en tablett innehållande acetylsalicylsyra. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med en liten mängd kallt vatten eller flytande föda. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:08      Tabletterna är speciellt utformade för att ge något långsammare frisättning av det verksamma ämnet för att minska risken för blodtrycksfall. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran men får inte krossas eller tuggas eftersom deras speciella utformning då förstörs.
- 56:09      Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna tuggas.
- 56:1        Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Omtableternadelas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon. Om tabletterna måste krossas är det mycket viktigt att den som gör detta känner till hur läkemedlet ska hanteras på ett säkert sätt. Skyddshandskar och ögonskydd rekommenderas.
- 56:10      Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas men får inte krossas eller tuggas eftersom de då verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 56:11      Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med fruktjuice eller yoghurt. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:12      Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Tabletterna har därför en hinna som döljer smaken. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas.
- 56:13      Innehåller i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna tuggas.
- 56:14      Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte krossas eller tuggas. Vid sväljsvårigheter kan de delas i skåran. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Observera att en halv tablett inte motsvarar halv dos.
- 56:15      Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med t.ex. ett halvt glas vatten eller strös över mat, t.ex. filmjolk, gröt eller glass.
- 56:16      Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna sväljs hela. Vid stora sväljsvårigheter kan man i undantagsfall öppna kapseln och blanda innehållet med lite juice. Det kan vara bra om den som öppnar kapseln använder skyddshandskar eftersom det finns risk för hudirritation.
- 56:17      Nexium-tabletterna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna röras ut i ett halvt glas vatten (ej kolsyrat). Blandningen dricks inom 30 minuter följt av vatten för att skölja ner alla korn. Om tabletterna krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet.

- 56:18 Tabletterna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna röras ut i ett halvt glas vatten (ej kolsyrat). Blandningen dricks inom 30 minuter följt av vatten för att skölja ner alla korn. Om tabletterna krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet.
- 56:19 Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras i den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och kornen sväljas med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:2 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Det är inte heller undersökt hur effekten av läkemedlet påverkas om tabletterna delas eller krossas.
- 56:20 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa.
- 56:21 Tabletterna har en hinna för att förhindra att det verksamma ämnet inandas eller kommer i kontakt med huden. Krossade eller delade tabletter ska inte hanteras av kvinnor som är eller kan bli gravida. Det verksamma ämnet kan hämma utvecklingen av ett manligt fosters yttre könsorgan.
- 56:22 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite vatten eller mat. Det ska därefter intas så fort som möjligt. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:23 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet omedelbart sväljas med vätska.
- 56:24 Tabletterna ska sväljas hela eller delade (har brytskåra). Om tabletterna tuggas eller krossas kan de ge för kraftig effekt med ökad risk för biverkningar.
- 56:25 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran men får inte krossas eller tuggas eftersom de då verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid behov går det även att slamma upp tabletterna i vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen och att inte tugga sönder kornen.
- 56:26 Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas eller krossas. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:27 Tabletterna bör sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med det verksamma ämnet, som har en irriterande effekt på slemhinnor. Om tabletterna krossas eller tuggas finns risk för irritation i matstrupen. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran men delarna bör sväljas hela.
- 56:28 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite mat. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:29 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:3 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna är mycket hårda och svåra att skära sönder. Om kapslarna delas är det osäkert om man får i sig hela dosen. Dessutom smakar innehållet i kapslarna illa.
- 56:30 Tabletterna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med det verksamma ämnet, som har en irriterande effekt på slemhinnor. Om tabletterna krossas eller tuggas så att de små kornen i tabletterna går sönder finns risk för irritation i matstrupen. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran och delarna sväljas hela. Tabletterna kan även lösas i vatten. Man måste då vara noga med att svälja alla korn.
- 56:31 Tabletterna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med det verksamma ämnet, som har en irriterande effekt på slemhinnor. Om tabletterna krossas eller tuggas så att de små kornen i tabletterna går sönder finns risk för irritation i matstrupen. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna lösas i vatten. Man måste då vara noga med att svälja alla korn.
- 56:32 Det verksamma ämnet är vävnadsretande. Om det är nödvändigt att dela eller krossa tabletterna bör man förhindra inandning och hudkontakt samt tvätta händerna efteråt.
- 56:33 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite tomat- eller apelsinjuice. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:34 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet är starkt färgande. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med riklig mängd vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:35 Tabletterna kan delas eller krossas men det är inget som rekommenderas eftersom innehållet kan missfärga tänder och munhåla.
- 56:36 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Det finns

en möjlighet att öppna kapseln och ta kornen tillsammans med vatten men det är ingenting som rekommenderas eftersom kapseln innehåller många små lätta korn som lätt sprätter iväg.

- 56:37 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om kapslarna delas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon.  
Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet bladas i lite mat. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Pulvret är mycket lätt och är därför svårt att blanda med vätska eftersom det lägger sig på ytan. Om kapslarna delas är det viktigt att den som gör detta känner till hur läkemedlet ska hanteras på ett säkert sätt. Till exempel kan handskar användas vid delning av kapslarna.
- 56:38 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas därför att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt bör det gå att öppna kapslarna och svälja innehållet med vatten. En kapsel innehåller både en tablett och granulat. Man ska vara noga med att få i sig allt innehåll i kapseln.
- 56:39 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de har en bitter smak och verkar bedövande, vilket kan upplevas obehagligt om tabletterna tuggas.
- 56:4 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna sväljs hela. Teoretiskt går det dock att öppna kapseln och t ex strö innehållet över maten.
- 56:40 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att kapslarna sväljs hela. Om detta inte är möjligt bör det gå att dela dem och svälja innehållet med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Pulvret i kapseln är olösligt i vatten och utan smak. Eventuell delning av kapseln bör diskuteras med behandlande läkare.
- 56:41 Det verksamma ämnet (kaliumklorid) kan irritera slemhinnorna i mage och tarm och smakar dessutom illa. För att skydda slemhinnorna och dölja smaken är varje enskild kaliumklorid-kristall omgiven av ett skyddande lager. För att inte det skyddande lagret ska förstöras bör tabletterna sväljas hela. De kan dock slammas upp i vatten eller delas i skåran, men får ej krossas till pulver eller tuggas.
- 56:42 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas.
- 56:43 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös på lite mat, t ex fruktmos. Maten får inte vara varm eftersom effekten då kan påverkas. Hela blandningen ska intas direkt. Innehållet i kapslarna får inte krossas, tuggas eller delas upp i flera doser.
- 56:44 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite mat eller dryck. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:45 Depotgranulaten bör sväljas hela tillsammans med vätska eller blandas ned i föda (t.ex. yoghurt, gröt). De får inte tuggas eftersom det då finns risk för att de verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 56:46 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med vatten, fil eller yoghurt. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:47 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna sväljs hela. I de fall kunden absolut inte kan svälja kapslarna hela måste frågan diskuteras med läkare och tillverkaren.
- 56:48 Det verksamma ämnet sönderdelas snabbt och då frigörs saltsyra. Om man löser upp, tuggar eller suger på tablett kan den bildade saltsyran skada tänderna.
- 56:49 Tabletterna bör sväljas hela för att ge så bra effekt som möjligt. Tabletterna har en hinna som gör att de snabbt och fullständigt löses upp i magen. Om tabletterna krossas eller tuggas kan läkemedlets effekt påverkas. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran och delarna sväljas hela.
- 56:5 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Kapslarna är gjutna och svåra att dela. Om man försöker dela dem finns risk för spill och det är då inte säkert att man får i sig hela dosen.
- 56:50 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tabletterna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon.  
Tabletterna kan dock delas och där är då viktigt att den som gör detta känner till hur läkemedlet ska hanteras på ett säkert sätt. Till exempel ska händerna tvättas omedelbart efter hantering av delade tabletter. Handskar kan användas vid delning av tabletter.
- 56:51 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. Vid sväljsvårigheter kan de lösas i cirka ett halvt glas vatten. Det blir en grumlig lösning. OBS! Trots att tabletterna har en skåra får de inte delas om syftet är att ta halv dos eftersom man inte vet om det verksamma ämnet är jämnt fördelat i tablett.

- 56:52 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tablettorna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna lösas i mineralvatten eller äppeljuice. Lämplig mängd vätska är 50 ml till en 100 mg-tablett och 200 ml till en 400 mg-tablett. Blandningen rös om med sked tills tablettorna har lösts fullständigt och dricks därefter omedelbart.
- 56:53 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan man öppna kapseln och tömma innehållet i munnen.
- 56:54 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Dessutom smakar det verksamma ämnet illa.
- 56:55 Tablettorna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om tablettorna krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekter av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas (har dock ingen skåra) och blandas ut i vatten eller sur vätska (juice). Blandningen dricks inom 30 minuter följt av vatten för att skölja ner alla kornen.
- 56:56 Kapslarna bör sväljas hela för att effekten ska bli så bra som möjligt. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas utan att tuggas.
- 56:57 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet kan läggas på en sked med fil eller kräm innan de sväljes. Därefter bör man dricka vatten för att vara säker på att alla granula sväljs ned. Man ska inte tömma ur kapslarna i ett glas vatten eftersom granula är tunga och faller till botten. Det finns då en risk att man inte får i sig hela dosen.
- 56:58 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med rikligt mängd vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:59 Vid sväljsvårighet kan kapslarna öppnas och innehållet strös på lite mat, t.ex. fruktmos. Hela blandningen ska intas direkt. Det är bra om man dricker lite vätska efteråt, till exempel vatten. Innehållet i kapslarna får inte krossas, tuggas eller delas upp i flera doser.
- 56:60 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter går det att tugga men innehållet smakar illa.
- 56:61 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i en lite skål med max en tesked sött livsmedel för att dölja den bittra smaken. Exempel på livsmedel är chokladsås, dessertsåser, äppelmos eller yoghurt. Blandningen måste sväljas genast efter beredning. Skålen sköljs med lite vatten som dricks upp för att man ska få i sig hela dosen.
- 56:62 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna delas eller krossas. Det rekommenderas därför att tablettorna sväljs hela men om detta inte är möjligt bör det gå att dela eller krossa dem. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:63 Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekter av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med sur vätska (juice) eller föda som inte behöver tuggas t.ex. filmjölk eller yoghurt. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:64 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med riklig mängd vatten. Pulvret kan även röras ut i till exempel sylt eller yoghurt för att dölja smaken. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:65 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i flytande föda eller dryck. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:66 Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas i skåran. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:67 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i en sked vatten eller saft. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:68 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet är starkt färgande. Det är inte heller undersökt hur läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna eventuellt öppnas och innehållet slammas upp i lite vatten.
- 56:69 Depotkapslarna frisätter successivt mindre mängder läkemedel genom hela magtarmkanalen. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas i skåran men får inte krossas eller tuggas

eftersom de då verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vi behöver gå det även att slamma upp tablettorna i ca 3 matskedar vatten och dricka omedelbart. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen och att inte tugga sönder kornen.

- 56:70 Kapslarna ska verka i tarmen. Kornen i kapslarna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magen. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i till exempel lite vatten. Kornen får dock inte tuggas eftersom man då förstör den skyddande hinnan. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:71 Depotkapslarna ska verka i tarmen och innehåller korn som har en hinna för att förhindra att kornen löses upp i magsäcken. Dessutom frisätter kornen mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas försämras effekten av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas blandat med en matsked äppelmos. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:72 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med något livsmedel som döljer smaken. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Innehållet i kapseln måste intas direkt efter att kapseln öppnats.
- 56:73 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Innehållet i kapseln måste intas direkt efter att kapseln öppnats.
- 56:74 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan man i undantagsfall öppna kapslarna och blanda innehållet med t.ex. filmjolk, yoghurt, sylt eller juice. Det är viktigt då att skölja munnen med vatten efteråt för att inte den normala bakteriefloran i munnen ska påverkas av läkemedlet.
- 56:75 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite juice eller vatten. Blandningen måste intas omedelbart. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:76 Tablettorna bör inte delas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:77 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna delas eller krossas. Dessutom smakar innehållet i tablettorna illa. Tillverkarens rekommendation är därför att tablettorna ska sväljas hela. Om man har mycket svårt att svälja och tablettorna delas ska man vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:78 Tablettorna ska inte tuggas. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna läggas i ett glas vatten. Blandningen rörs om ordentligt tills vattnet får ett mjölkigt utseende och dricks sedan omedelbart. Glaset fylls med vatten, som sedan dricks upp. Detta upprepas flera gånger för att säkerställa att man får i sig hela dosen.
- 56:79 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:8 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna delas eller krossas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:80 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Det är inte undersökt hur läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Om kapslarna öppnas finns dessutom risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:81 Tablettorna har en hinna för att skydda det verksamma ämnet från att förstöras av luft.
- 56:82 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan man i undantagsfall öppna kapseln och svälja innehållet med vatten eller blandat med lite filmjolk/yoghurt på en sked. Kapslarna kan även tuggas sönder.
- 56:83 Tablettorna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna lösas i en liten mängd vatten före intag. Lösningen får en bitter smak.
- 56:84 Kapslarna innehåller korn som har en hinna som förhindrar att kornen löses upp i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas skadas hinnan och risken för biverkningar från magen ökar. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och kornen sväljas med riklig mängd vätska. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:85 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med lite filmjolk/yoghurt på en sked. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:86 Granulatet består av korn som är sockerdragerade för att kostfibrerna i läkemedlet ska börja svälla först i magsäcken och därmed ge bästa möjliga effekt. Om kornen tuggas skadas sockerdrageringen.
- 56:87 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite vatten eller flytande föda. Blandningen måste intas omedelbart. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:88 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:89 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös på mat (t.ex. mjök, potatis) eller blandas i modersmjölkersättning. Det ska inte blandas med sura drycker t.ex. apelsinjuice.

- 56:9 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt bör det gå att dela dem och svälja innehållet med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:90 Innehållet i kapslarna är flytande. De är inte undersökt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna delas, krossas eller tuggas. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna bör sväljas hela.
- 56:91 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tablettorna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Vid sväljsvårigheter kan man lägga tablettan hel i ett glas kranvatten, röra om tills den har lösts upp (kan ta 20 minuter) och därefter genast dricka upp lösningen. Glaset rengörs från läkemedelsrester genom att man åter fyller det till hälften med vatten, sköljer runt och dricker.
- 56:92 Tablettorna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas eller krossas. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:93 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna tuggas eller krossas. Det rekommenderas därför att tablettorna sväljs hela. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas i skåran.
- 56:94 Tablettorna är små och oftast lätta att svälja. Vid sväljsvårigheter kan de dock krossas. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:95 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det kan påverka upptaget av läkemedlet i kroppen. Det finns också risk för att man inte får i sig hela dosen om kapslarna öppnas.
- 56:96 Innehållet i kapslarna är flytande. Om kapslarna delas är det osäkert om man får i sig hela dosen.
- 56:97 Tablettorna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas eller krossas och blandas med lite vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:98 Tablettorna är hårda och svåra att dela. Om tablettorna krossas är det osäkert om man får i sig hela dosen. Läkemedlet finns även som dispergerbara (lösliga) tabletter om man har svårt att svälja tablettorna.
- 56:99 Depotkapslarna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas ut i kall vätska och därefter omedelbart sväljas. Innehållet i kapslarna får inte tuggas eller krossas.